

Häckningsfynd av flodsångare och artens förekomst i Kronobergs län

Flodsångaren är en ovanlig fågelart i Kronobergs län. Hittills har 69 fynd gjorts. Den är inte årlig men har vissa år som mest påträffats på sju platser. 2013 gjordes ett häckningsfynd då nyligen flygga ungar fångades för ringmärkning.


Den 22 juli 2013 fångades i samband med nätfångst för ringmärkning två unga flodsångare. Fångstplatsen är belägen söder om Högnalöv i Uråsa som ligger i Växjö kommun. De fastnade samtidigt i samma nät och kunde enkelt åldersbestämmas tack vare ving- och stjärt pennornas helt oslitna spetsar. De ruggade kroppsfjädrarna och bedömdes ha nått stadie 4. Det pekar mot att de var ungefär fem-sex veckor gamla och således kläckta i mitten av juni.

En sjungande flodsångare har observerats på platsen vid tre tillfällen i juni, första gången 2 juni, samt den 16 juli. De bägge flygga ungfågeln är med stor säkerhet resultatet av en häckning på platsen.




Flodsångarens förekomst i Kronobergs län

Fram till och med 1987 hade arten påträffats vid fem tillfällen i länet (Ylvén 1987). Därefter har det tillkommit 64 fynd så att det t o m 2014 finns 69 fynd rapporterade till den regionala rapportkommittén i länet. Det framgår av diagram 1 som visar antalet fynd per år att arten saknas helt vissa år men också att den tycks ha blivit något vanligare sett över den senaste 25-årsperioden. De två senaste åren 2013 och 2014 har inneburit högstanoteringar för hela det insamlade materialet.




Flest fynd av flodsångare har gjorts i Växjö kommun. Diagram 2 visar fördelningen över länets kommuner. Bilden återspeglar till viss del den ornitologiska aktiviteten i länet. Dock är det intressant att länets sydvästra del saknar fynd av flodsångare trots att det finns aktiva fågelskådare. Arten är sydostlig och kan förväntas vara något talrikare i länets sydöstra delar.



Fenologi

Det går förstås inte att säga när en individ anlände, bara när den första gången observerades. Diagram 3 måste alltså tolkas utifrån den omständigheten. Den tidigaste observationen är gjord 10 maj vilket är extremt tidigt. Det finns dock nationellt flera observationer i första majdekaden. Från 20 maj görs ett ökat antal fynd. Första dekaderna i juni hittas de flesta flodsångarna.



Den senaste observationen är gjord 28 juli.

Hur länge stannar de på lokalen?

Frågan går inte att besvara eftersom det inte är känt hur många gånger lokalen har besökts av fågelskådare. Av de 69 fynden av flodsångare har dock 43 rapporterats två intilliggande dagar eller mer. Enligt definitionen av kriterierna i Atlasinventeringen innebär det att i Kronoberg har gjorts ett säkert häckningsfynd (se ovan) och 42 möjliga häckningsfynd (kriterium 5). Längst tid har en flodsångare stannat knappt nio veckor på lokalen.

Roland Ylvén

Litteratur:

Ylvén, R. 1987. Nattsångare i Kronobergs län. Milvus 1987/2